

АРВ-ПРЕПАРАТЫ

Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ)

Торговое наименование	Форма и состав препарата	Дозировка в сутки, взрослые**	Мин. цена в мире, USD, за ед. (табл/капс/мл)***	Примечание
Видекс (на фото), есть генерики*	диданозин DDI 125, 200, 250, 400 мг 100 мг (таб.жев.), порошок 2 и 4г	<60 кг - 250 мг 1 раз в сутки, > 60 кг - 400 мг 1 раз в сутки	информация недоступна	
Зерит (на фото), есть генерики	ставудин D4T , 30 и 40 мг	<60 кг - 30 мг 2 раза в сутки, > 60 кг - 40 мг 2 раза в сутки	информация недоступна	можно использовать только в исключительных случаях
Зиаген (на фото), есть генерики	абакавир ABC 300 мг, 600 мг 60 мг, 20 мг/мл (дет.)	300 мг 2 раза в сутки или 600 мг 1 раз в сутки	0,204-0,304 (300 мг) 0,083-0,100 (60 мг) 0,036-0,081 (20 мг/мл)	
Ретровир (на фото), есть генерики	зидовудин AZT 300 мг 100, 250 мг (дет.) 10 мг/мл (дет.)	300 мг 2 раза в сутки	0,159 (250 мг) 0,096-0,117 (300 мг) 0,046-0,102 (100 мг) 0,009-0,046 (10 мг/мл)	
Эмтрива (на фото), есть генерики	эмтрицитабин FTC 200 мг	200 мг 1 раз в сутки	0,200 (200 мг)	
Эпивир (на фото), есть генерики	ламивудин 3TC 150 и 300 мг, 10 мг/мл (дет.)	150 мг 2 раза в сутки или 300 мг 1 раз в сутки	0,033-0,103 (150 мг) 0,058-0,167 (300 мг) 0,008-0,047 (10 мг/мл)	

Нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ)

Торговое наименование	Форма и состав препарата	Дозировка в сутки, взрослые**	Мин. цена в мире, USD, за ед. (табл/капс/мл)***	Примечание
Виреад (на фото), есть генерики	тенофовир TDF 300 мг	300 мг 1 раз в сутки	0,132-1,000 (300 мг)	

Ингибиторы протеазы (ИП)

Торговое наименование	Форма и состав препарата	Дозировка в сутки, взрослые**	Мин. цена в мире, USD, за ед. (табл/капс/мл)***	Примечание
Аптивус	тиранавир TPV 250 мг	500 мг + RTV 200 мг 2 раза в сутки	информация недоступна	
Инвираз (на фото), есть генерики	саквинавир SQV 200 мг (капс.) 500 мг	1000 мг + RTV 100 мг 2 раза в сутки	информация недоступна	
Калетра , Алувия , (на фото), есть генерики	лопинавир+ритонавир LPV/r 200/50 мг 100/25 мг; 80/20 мг/мл (дет.)	800 мг + RTV 200 мг 1 раз в сутки или 400 мг + RTV 100 мг 2 раза в сутки	0,182-0,507 (200/50 мг) 0,099-0,254 (100/25 мг) 0,101-0,203 (80/20 мг/мл)	
Презиста (на фото), есть генерики	дарунавир DRV 300, 400, 600 и 800 мг	800 мг + RTV 100 мг 1 раз в сутки При резистентности: 600 мг + RTV 100 мг 2 раза в сутки	0,555-0,589 (300 мг) 1,000 (400 мг) 0,483-0,677 (200 мг) 0,533-0,733 (300 мг)	
Реатаз (на фото), есть генерики	атазанавир ATV 100, 150, 200 и 300 мг порошок 180 гр	300 мг + RTV 100 мг 1 раз в сутки или 400 мг 1 раз в сутки (при непереносимости RTV); с EFV - 400 мг + RTV 1 раз в сутки, с антагонистами рецептора H2 или TDF - 400 мг + RTV 100 мг 1 раз в сутки	0,267 (100 мг) 0,367-0,564 (150 мг) 0,483-0,677 (200 мг) 0,533-0,733 (300 мг)	
Телзир	фосампренавир FPV 700 мг суспензия 50 мг/мл	1400 мг 2 раза в сутки или 1400 мг + RTV 200 мг 1 раз в сутки, или 1400 мг + RTV 100 мг 1 раз в сутки, или 700 мг + RTV 100 мг 2 раза в сутки	информация недоступна	

Усилители ИП

Торговое наименование	Форма и состав препарата	Дозировка в сутки, взрослые**	Мин. цена в мире, USD, за ед. (табл/капс/мл)***	Примечание
Норвир (на фото), есть генерики	ритонавир RTV или r 100 мг 80 мг/мл (дет.)	зависит от ИП	0,114-0,433 (100 мг) 0,091 (80 мг/мл)	
Tybst	кобицистат COBI или /c , 150 мг таблетки	150 мг 1 раз в сутки (с ATV 300 мг или DRV 800 мг)	информация недоступна	одобрен в США и ЕС

Комбинированные препараты с фиксированной дозировкой (КФД)

Торговое наименование	Форма и состав препарата	Дозировка в сутки, взрослые**	Мин. цена в мире, USD, за ед. (табл/капс/мл)***	Примечание
Атрипла (на фото), есть генерики	эфаверенз EFV 600 мг + эмтрицитабин FTC 200 мг + тенофовир TDF 300 мг	1 табл. 1 раз в сутки	0,433-2,830	
Descovy	тенофовира алафенамид TAF 25 мг + эмтрицитабин FTC 200 мг	1 табл. 1 раз в сутки	информация недоступна	одобрен в США и ЕС
Genvoya	эввитегравир EVG 150 мг + кобицистат COBI 150 мг + тенофовир алафенамид TAF 10 мг + эмтрицитабин FTC 200 мг	1 табл. 1 раз в сутки	информация недоступна	одобрен в США и ЕС
Кивекса (на фото), есть генерики	абакавир ABC 600 мг + ламивудин 3TC 300 мг 60/30 мг (дет.)	1 табл. 1 раз в сутки	0,533-0,624 (600/300 мг) 0,088-0,157 (60/30 мг)	
Комбивир (на фото), есть генерики	зидовудин AZT 300 мг + ламивудин 3TC 150 мг 60/30 мг (дет.)	1 табл. 2 раза в сутки	0,115-0,208 (300/150 мг) 0,038-0,050 (60/30 мг)	
Odefsey	рилпивирин RPV 25 мг + тенофовир алафенамид TAF 25 мг + эмтрицитабин FTC 200 мг	1 табл. 1 раз в сутки	информация недоступна	одобрен в США и ЕС
Rezolsta (Prezcobix в США)	дарунавир DRV 800 мг + кобицистат COBI 150 мг	1 табл. 1 раз в сутки	информация недоступна	одобрен в США и ЕС
Stribild	эввитегравир EVG 150 мг + кобицистат COB 150 мг + эмтрицитабин FTC 200 мг + тенофовир TDF 300 мг	1 табл. 1 раз в сутки	информация недоступна	одобрен в США и ЕС
Тривизир (на фото), есть генерики	зидовудин AZT 300 мг + ламивудин 3TC 150 мг + абакавир ABC 300 мг	1 табл. 2 раза в сутки	0,433-0,512	
Triumeq	долутегравир DTG 50 мг + абакавир ABC 600 мг + ламивудин 3TC 300 мг	1 табл. 1 раз в сутки	информация недоступна	одобрен в США и ЕС
Трувада (на фото), есть генерики	тенофовир TDF 300 мг + эмтрицитабин FTC 200 мг	1 табл. 1 раз в сутки	0,203-1,500	
Эвиплера , Complexa	тенофовир TDF 300 мг + эмтрицитабин FTC 200 мг + рилпивирин RPV 25 мг	1 табл. 1 раз в сутки	информация недоступна	
Evotaz	атазанавир ATV 300 мг + кобицистат COBI 150 мг	1 табл. 1 раз в сутки	информация недоступна	одобрен в США и ЕС

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ)

Торговое наименование	Форма и состав препарата	Дозировка в сутки, взрослые**	Мин. цена в мире, USD, за ед. (табл/капс/мл)***	Примечание
Вирамун (на фото), есть генерики	невирапин NVP 200 мг (табл. и капс.)	200 мг 2 раза в сутки или 400 мг 1 раз в сутки	0,038-0,600 (200 мг таб.)	
Интеленс	этравирин ETR 100 мг и 200 мг	200 мг 2 раза в сутки	0,300-0,320 (100 мг)	
Стокрин , Сустива (на фото), есть генерики	эфаверенз EFV 600 мг 200 мг (табл. и капс.)	600 мг 1 раз в сутки	0,106-0,650 (600 мг) 0,058-0,070 (200 мг)	
Эдюрант	рилпивирин RPV 25 мг	25 мг 1 раз в сутки	информация недоступна	

Ингибиторы интегразы (ИИ)

Торговое наименование	Форма и состав препарата	Дозировка в сутки, взрослые**	Мин. цена в мире, USD, за ед. (табл/капс/мл)***	Примечание
Vitekta	эввитегравир EVG 85 мг и 150 мг	С ATV/RTV или LPV/RTV: 85 мг 1 раз в сутки С DRV/RTV, FPV/RTV или TPV/RTV: 150 мг 1 раз в сутки	информация недоступна	одобрен в США и ЕС
Исентресс	ралтегравир RAL 400 мг	400 мг 2 раза в сутки	0,925 (400 мг)	
Тивикай	долутегравир DTG 50 мг	50 мг 1 раз в сутки; в сочетании с EFV, FPV/RTV, TPV/RTV или рифампином: 50 мг 2 раза в сутки	информация недоступна	

Ингибиторы CCR5

Торговое наименование	Форма и состав препарата	Дозировка в сутки, взрослые**	Мин. цена в мире, USD, за ед. (табл/капс/мл)***	Примечание
Целзентри	маравирик MVC 150 мг или 300 мг	150 мг 2 раза в сутки или 300 мг 2 раза в сутки, или 600 мг 2 раза в сутки	информация недоступна	

Ингибиторы слияния

Торговое наименование	Форма и состав препарата	Дозировка в сутки, взрослые**	Мин. цена в мире, USD, за ед. (табл/капс/мл)***	Примечание
Фузеон	T-20, энфувиртид ENF 90 мг	Иньекции 90 мг 2 раза в сутки	информация недоступна	

Рекомендованные схемы лечения ВОЗ

Сводное руководство по использованию антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, июнь 2016 года

Категория	Схемы первого ряда	Схемы второго ряда для взрослых, подростков, беременных женщин и детей	Схемы третьего ряда для взрослых, подростков, беременных женщин и детей
Взрослые	Предпочтительная схема: тенофовир + ламивудин (или эмтрицитабин) + эфаверенз (КФД) Альтернативные схемы [a, b]: 1) зидовудин + ламивудин + эфаверенз (или невирапин) 2) тенофовир + ламивудин (или эмтрицитабин) + долутегравир [c] 3) тенофовир + ламивудин (или эмтрицитабин) + эфаверенз 400 мг [c, e] 4) тенофовир + ламивудин (или эмтрицитабин) + невирапин	После неудачи схемы из 2 НИОТ + эфаверенз: 2 НИОТ + атазанавир/ ритонавир или лопинавир/ ритонавир [f] 2 НИОТ + дарунавир/ ритонавир [g] После неудачи схемы из 2 НИОТ + долутегравир: 2 НИОТ + атазанавир/ ритонавир или лопинавир/ ритонавир 2 НИОТ + дарунавир/ ритонавир	Дарунавир/ ритонавир [g] + долутегравир [h] (или ралтегравир) +/- 1-2 НИОТ Дарунавир/ ритонавир [g] + 2 НИОТ +/- ННИОТ Оптимизация схемы лечения после определения строения РНК вируса
Беременные и кормящие грудью женщины	Предпочтительная схема: тенофовир + ламивудин (или эмтрицитабин) + эфаверенз Альтернативные схемы: 1) зидовудин + ламивудин + эфаверенз (или невирапин) 2) тенофовир + ламивудин (или эмтрицитабин) + невирапин	После неудачи схемы из 2 НИОТ + эфаверенз: 2 НИОТ + атазанавир/ ритонавир или лопинавир/ ритонавир [f] 2 НИОТ + дарунавир/ ритонавир	Дарунавир/ ритонавир [g] + долутегравир [h] (или ралтегравир) +/- 1-2 НИОТ
Подростки	Предпочтительная схема: тенофовир + ламивудин (или эмтрицитабин) + эфаверенз Альтернативные схемы [a, b]: 1) зидовудин + ламивудин + эфаверенз (или невирапин) 2) тенофовир (или абакавир) + ламивудин (или эмтрицитабин) + долутегравир [c, d] 3) тенофовир (или абакавир) + ламивудин (или эмтрицитабин) + эфаверенз 400 мг [c, d, e] 4) тенофовир (или абакавир) + ламивудин (или эмтрицитабин) + невирапин	Подростки старше 10 лет После неудачи схемы из 2 НИОТ + эфаверенз: 2 НИОТ + атазанавир/ ритонавир или лопинавир/ ритонавир [f] 2 НИОТ + дарунавир/ ритонавир [g] После неудачи схемы из 2 НИОТ + долутегравир: 2 НИОТ + атазанавир/ ритонавир или лопинавир/ ритонавир 2 НИОТ + дарунавир/ ритонавир	Дарунавир/ ритонавир [h] + долутегравир [g] (или ралтегравир) +/- 1-2 НИОТ Дарунавир/ ритонавир [g] + 2 НИОТ +/- ННИОТ Оптимизация схемы лечения после определения строения РНК вируса
Дети от 3 до 10 лет	Предпочтительная схема: абакавир + ламивудин + эфаверенз Альтернативные схемы: 1) абакавир + ламивудин + невирапин 2) зидовудин + ламивудин + эфаверенз (или невирапин) 3) тенофовир + ламивудин (или эмтрицитабин) + эфаверенз (или невирапин)	Дети от 0 до 10 лет: После неудачи схемы из 2 НИОТ + лопинавир/ ритонавир: 1) младше 3 лет: 2 НИОТ + ралтегравир [i] 2) старше 3 лет: 2 НИОТ + эфаверенз или ралтегравир	1) ралтегравир (или долутегравир) [k] + 2 НИОТ 2) дарунавир/ ритонавир [j] + 2 НИОТ 3) дарунавир/ ритонавир [j] + ралтегравир (или долутегравир) [k] +/- 1-2 НИОТ
Дети младше 3 лет	Предпочтительная схема: абакавир (или зидовудин) + ламивудин + лопинавир/ ритонавир Альтернативная схема: абакавир (или зидовудин) + ламивудин + невирапин	После неудачи схемы из 2 НИОТ + эфаверенз: 2 НИОТ + атазанавир/ ритонавир [j] или лопинавир/ ритонавир	

[a] Необходимо прекратить использование ставудина в схемах 1 ряда для лечения взрослых и подростков
[b] В некоторых случаях могут использоваться абакавир или бустированные ИП (атазанавир/ритонавир, дарунавир/ритонавир, лопинавир/ритонавир)
[c] Данные по безопасности и эффективности долутегравира и эфаверенза 400 мг при использовании их в схемах лечения беременных, людей с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ и подростков младше 12 лет пока недоступны
[d] Условная рекомендация, среднее качество доказательств
[e] Сниженная дозировка эфаверенза (400 мг/день)
[f] В качестве альтернативной схемы второго ряда для лечения взрослых и подростков может использоваться ралтегравир + лопинавир/ритонавир
[g] Рекомендованная дозировка препарата дарунавир/ритонавир у пациентов с опытом лечения ИП должна быть 600 мг/100 мг два раза в день
[h] Данные по безопасности и эффективности долутегравира для подростков младше 12 лет и беременных женщин пока недоступны
[i] Если ралтегравир недоступен, менять схему не рекомендуется (см. полную версию Рекомендаций)
[j] Атазанавир/ритонавир может быть использован для лечения детей старше 3 месяцев (см. полную версию Рекомендаций)
[k] Если долутегравир недоступен, для детей, которые потеряли неудачу лечения схемами второго ряда на основе ИП и в схемах которых не было ралтегравира, можно использовать ралтегравир (см. полную версию Рекомендаций)
[l] Не следует использовать дарунавир/ритонавир для детей младше 3 лет.

Информация о суточной дозировке и кратности дозирования получена с сайта <https://www.cdc.gov/generics/> (англ. generic) - лекарственное средство, продающееся под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия препарата, и предназначенное для лечения тех же самых состояний болезни. **Оригинальные цены на препараты указаны по состоянию на июль 2013 года. Обновленная информация публикуется на сайте <http://msfaccess.org/>. Планшет обновлен в августе 2016 года.