

АРВ-ПРЕПАРАТИ

Нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (НІЗТ)

Торгова назва	МНН, дозування	Добова доза, дорослі	Мін. ціна у світі, USD, за од. (табл/капс/мл)	Примітка
Відекс (на фото), є генерики	діданозин DDI 125, 200, 250, 400 мг	<60 кг - 250 мг 1 раз на добу, ≥ 60 кг - 400 мг 1 раз на добу	інформація недоступна	
Емтрива (фото), є генерики	емтрицитабін FTC 200 мг	200 мг 1 раз на добу	0,200 (200 мг)	
Епівір (на фото), є генерики	ламівудин 3TC 150 і 300 мг, 10 мг/мл (дит.)	150 мг 2 рази на добу або 300 мг 1 раз на добу	0,033-0,103 (150 мг) 0,058-0,167 (300 мг) 0,008-0,047 (10 мг/мл)	
Зерит (на фото), є генерики	ставудин D4T 30 мг, 40 мг	<60 кг - 30 мг 2 рази на добу, ≥ 60 кг - 40 мг 2 рази на добу	інформація недоступна	використовувати тільки у виняткових випадках!!!
Зіаген (на фото), є генерики	абакавір ABC 300 мг 60 мг, 20 мг/мл (дит.)	300 мг 2 рази на добу або 600 мг 1 раз на добу	0,204-0,304 (300 мг) 0,083-0,100 (60 мг) 0,036-0,081 (20 мг/мл)	
Ретровір (на фото), є генерики	зидовудин AZT 250 мг, 300 мг, 60, 100 мг (дит.) 10 мг/мл (дит.)	300 мг 2 рази на добу	0,159 (250 мг) 0,096-0,117 (300 мг) 0,029-0,066 (60 мг) 0,046-0,102 (100 мг) 0,009-0,046 (10 мг/мл)	

Нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази (НТІЗТ)

Торгова назва	МНН, дозування	Добова доза, дорослі	Мін. ціна у світі, USD, за од. (табл/капс/мл)	Примітка
Віреад (на фото), є генерики	теніфовір TDF 300 мг	300 мг 1 раз на добу	0,132-1,000 (300 мг)	

Інгібітори протеази (ІП)

Торгова назва	МНН, дозування	Добова доза, дорослі	Мін. ціна у світі, USD, за од. (табл/капс/мл)	Примітка
Апівус	тіранавір TPV 250 мг	500 мг + RTV 200 мг 2 рази на добу	інформація недоступна	
Інвіраза	саквінавір SQV 200 мг, 500 мг	1000 мг + RTV 100 мг 2 рази на добу	інформація недоступна	
Калетра (на фото), Алувія є генерики	лопінавір + ритонавір LPV/r : 200/50 мг 100/25 мг; 80/20 мг/мл (дит.)	800 мг + RTV 200 мг 1 раз на добу або 400 мг + RTV 100 мг 2 рази на добу	0,507-0,182 (200/50 мг) 0,099-0,254 (100/25 мг) 0,101-0,203 (80/20 мг/мл)	
Презиста (на фото), є генерики	дарунавір DRV 300, 400, 600, 800 мг	800 мг + RTV 100 мг 1 раз на добу При резистентності: 600 мг + RTV 100 мг 2 рази на добу	0,555-0,589 (300 мг) 1,000 (400 мг) 1,110-1,500 (600 мг)	
Реатаз (на фото), є генерики	атазанавір ATV 100, 150, 200, 300 мг порошок 180 гр	300 мг + RTV 100 мг 1 раз на добу або 400 мг 1 раз на добу (при непереносимості RTV); з EFV - 400 мг + RTV 1 раз на добу, з антагоністами рецептора H2 або TDF - 400 мг + RTV 100 мг 1 раз на добу	0,267 (100 мг) 0,367-0,564 (150 мг) 0,483-0,677 (200 мг) 0,533-0,733 (300 мг)	
Телзір	фосампренавір FPV 700 мг, суспензія 50 мг/мл	1400 мг 2 рази на добу або 1400 мг + RTV 200 мг 1 раз на добу, або 1400 мг + RTV 100 мг 1 раз на добу, або 700 мг + RTV 100 мг 2 рази на добу	інформація недоступна	

Підсилювачі ІП

Торгова назва	МНН, дозування	Добова доза, дорослі	Мін. ціна у світі, USD, за од. (табл/капс/мл)	Примітка
Норвір (на фото), є генерики	ритонавір RTV або /r 100 мг, 80 мг/мл (дит.)	залежить від ІП	0,114-0,433 (100 мг) 0,091 (80 мг/мл)	
Tybst	кобіцистат COBI або /c, 150 мг	150 мг 1 раз на добу (с ATV 300 мг або DRV 800 мг)	інформація недоступна	схвалений в США і ЄС

Комбіновані препарати з фіксованим дозуванням (КФД)

Торгова назва	МНН, дозування	Добова доза, дорослі	Мін. ціна у світі, USD, за од. (табл/капс/мл)	Примітка
Атріпла (на фото), є генерики	ефавіренз EFV 600 мг + емтрицитабін FTC 200 мг + теніфовір TDF 300 мг	1 табл. 1 раз на добу	0,433-2,830	
Descovy	теніфовір алафенамід TAF 25 мг + емтрицитабін FTC 200 мг	1 табл. 1 раз на добу	інформація недоступна	схвалений в США і ЄС
Genvoya	елвітегравір EVG 150 мг + кобіцистат COBI 150 мг + теніфовір алафенамід TAF 10 мг + емтрицитабін FTC 200 мг	1 табл. 1 раз на добу	інформація недоступна	схвалений в США і ЄС
Евілпра, Complera	теніфовір TDF 300 мг + емтрицитабін FTC 200 мг + рілпівірін RPV 25 мг	1 табл. 1 раз на добу	інформація недоступна	
Evotaz	атазанавір ATV 300 мг + кобіцистат COBI 150 мг	1 табл. 1 раз на добу	інформація недоступна	схвалений в США і ЄС
Ківекса (на фото), є генерики	абакавір ABC 600 мг + ламівудин 3TC 300 мг 60/30 мг (дит.)	1 табл. 1 раз на добу	0,533-0,624 (600/300 мг) 0,088-0,157 (60/30 мг)	
Комбівір (на фото), є генерики	зидовудин AZT 300 мг + ламівудин 3TC 150 мг 60/30 мг (дит.)	1 табл. 2 рази на добу	0,115-0,208 (300/150 мг) 0,038-0,050 (60/30 мг)	
Odefsey	рілпівірін RPV 25 мг + теніфовір алафенамід TAF 25 мг + емтрицитабін FTC 200 мг	1 табл. 1 раз на добу	інформація недоступна	схвалений в США і ЄС
Rezolsta (Prezcobix в США)	дарунавір DRV 800 мг + кобіцистат COBI 150 мг	1 табл. 1 раз на добу	інформація недоступна	схвалений в США і ЄС
Stribild	елвітегравір EVG 150 мг + кобіцистат COBI 150 мг + емтрицитабін FTC 200 мг + теніфовір TDF 300 мг	1 табл. 1 раз на добу	інформація недоступна	схвалений в США і ЄС
Тризвир (на фото), є генерики	зидовудин AZT 300 мг + ламівудин 3TC 150 мг + абакавір ABC 300 мг	1 табл. 2 рази на добу	0,433-0,512	
Triumeq	долутегравір DTG 50 мг + абакавір ABC 600 мг + ламівудин 3TC 300 мг	1 табл. 1 раз на добу	інформація недоступна	схвалений в США і ЄС
Трувада (на фото), є генерики	теніфовір TDF 300 мг + емтрицитабін FTC 200 мг	1 табл. 1 раз на добу	0,203-1,500	

Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази (ННІЗТ)

Торгова назва	МНН, дозування	Добова доза, дорослі	Мін. ціна у світі, USD, за од. (табл/капс/мл)	Примітка
Віраму (на фото), є генерики	невірапін NVP 200 мг	200 мг 2 рази на добу або 400 мг 1 раз на добу	0,038-0,600 (200 мг таб)	
Едюрент	рілпівірін RPV 25 мг	25 мг 1 раз на добу	інформація недоступна	
Інтеленс	етравірін ETR 100 мг, 200 мг	200 мг 2 рази на добу	0,300-0,320 (100 мг)	
Стокрін, Сустіва (на фото), є генерики	ефавіренз EFV 600 мг, 200 мг, 50, 100 мг і 30 мг/мл (дит.)	600 мг 1 раз на добу	0,106-0,650 (600 мг) 0,058-0,070 (200 мг)	

Інгібітори інтегрази (ІІ)

Торгова назва	МНН, дозування	Добова доза, дорослі	Мін. ціна у світі, USD, за од. (табл/капс/мл)	Примітка
Vitekta	елвітегравір EVG 85 мг і 150 мг	3 ATV/RTV або LPV/RTV: 85 мг 1 раз на добу, 3 DRV/RTV, FPV/RTV або TPV/RTV: 150 мг 1 раз на добу	інформація недоступна	схвалений в США і ЄС
Ісентрес	ралтегравір RAL 400 мг	400 мг 2 рази на добу	0,925 (400 мг)	
Тівікай	долутегравір DTG 50 мг	50 мг 1 раз на добу; в поєднанні з EFV, FPV/RTV, TPV/RTV або рифампіном: 50 мг 2 рази на добу	інформація недоступна	

Інгібітори CCR5

Торгова назва	МНН, дозування	Добова доза, дорослі	Мін. ціна у світі, USD, за од. (табл/капс/мл)	Примітка
Целзентрі	маравірок MVC 150 мг або 300 мг	150 мг 2 рази на добу або 300 мг 2 рази на добу, або 600 мг 2 рази на добу	інформація недоступна	

Інгібітори злиття

Торгова назва	МНН, дозування	Добова доза, дорослі	Мін. ціна у світі, USD, за од. (табл/капс/мл)	Примітка
Фузеон	T-20, енфувіртід ENF 90 мг	Ін'єкції 90 мг 2 рази на добу	інформація недоступна	

Рекомендовані схеми лікування ВООЗ Зведені рекомендації по використанню антиретровірусних препаратів для лікування і профілактики ВІЛ-інфекції, червень 2016 року

Категорія	Схеми першого ряду	Схеми другого ряду для дорослих, підлітків, вагітних жінок та дітей	Схеми третього ряду для дорослих, підлітків, вагітних жінок та дітей
Дорослі	Рекомендована схема: теніфовір + ламівудин (або емтрицитабін) + ефавіренз (КФД) Альтернативні схеми [a, b]: 1) зидовудин + ламівудин + ефавіренз (або невірапін) 2) теніфовір + ламівудин (або емтрицитабін) + долутегравір [c] 3) теніфовір + ламівудин (або емтрицитабін) + ефавіренз 400 мг [c, e] 4) теніфовір + ламівудин (або емтрицитабін) + невірапін	Після невдачі схеми з 2 НІЗТ + ефавіренз: 2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір або лопінавір/ ритонавір [f] 2 НІЗТ + дарунавір/ ритонавір [g] Після невдачі схеми з 2 НІЗТ + долутегравір: 2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір або лопінавір/ ритонавір 2 НІЗТ + дарунавір/ ритонавір	дарунавір/ ритонавір [g] + долутегравір [h] (або ралтегравір) +/- 1-2 НІЗТ дарунавір/ ритонавір [g] + 2 НІЗТ +/- ННІЗТ Оптимізація схеми лікування після визначення будови РНК вірусу
Вагітні жінки і жінки, що годують груддю	Рекомендована схема: теніфовір + ламівудин (або емтрицитабін) + ефавіренз Альтернативні схеми: 1) зидовудин + ламівудин + ефавіренз (або невірапін) 2) теніфовір + ламівудин (або емтрицитабін) + невірапін	Після невдачі схеми з 2 НІЗТ + ефавіренз: 2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір або лопінавір/ ритонавір [f] 2 НІЗТ + дарунавір/ ритонавір	дарунавір/ ритонавір [g] + долутегравір [h] (або ралтегравір) +/- 1-2 НІЗТ
Підлітки	Рекомендована схема: теніфовір + ламівудин (або емтрицитабін) + ефавіренз Альтернативні схеми: 1) зидовудин + ламівудин + ефавіренз (або невірапін) 2) теніфовір (або абакавір) + ламівудин (або емтрицитабін) + долутегравір [c, d] 3) теніфовір (або абакавір) + ламівудин (або емтрицитабін) + ефавіренз 400 мг [c, d, e] 4) теніфовір (або абакавір) + ламівудин (або емтрицитабін) + невірапін	Після невдачі схеми з 2 НІЗТ + ефавіренз: 2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір або лопінавір/ ритонавір [f] 2 НІЗТ + дарунавір/ ритонавір [g] Після невдачі схеми з 2 НІЗТ + долутегравір: 2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір або лопінавір/ ритонавір 2 НІЗТ + дарунавір/ ритонавір	Підлітки старше 10 років Дарунавір/ ритонавір [h] + долутегравір [g] (або ралтегравір) +/- 1-2 НІЗТ Дарунавір/ ритонавір + 2 НІЗТ +/- ННІЗТ Оптимізація схеми лікування після визначення будови РНК вірусу
Діти від 3 до 10 років	Рекомендована схема: абакавір + ламівудин + ефавіренз Альтернативні схеми: 1) абакавір + ламівудин + невірапін 2) зидовудин + ламівудин + ефавіренз (або невірапін) 3) теніфовір + ламівудин (або емтрицитабін) + ефавіренз (або невірапін)	Після невдачі схеми з 2 НІЗТ + лопінавір/ ритонавір: до 3 років: 2 НІЗТ + ралтегравір [i] старше 3 років: 2 НІЗТ + ефавіренз або ралтегравір	Діти від 0 до 10 років: 1) ралтегравір (або долутегравір) [k] + 2 НІЗТ 2) дарунавір/ ритонавір [j] + 2 НІЗТ 3) дарунавір/ ритонавір [j] + ралтегравір (або долутегравір) +/- 1-2 НІЗТ [k]
Діти до 3 років	Рекомендована схема: абакавір (або зидовудин) + ламівудин + лопінавір/ ритонавір Альтернативна схема: абакавір (або зидовудин) + ламівудин + невірапін	Після невдачі схеми з 2 НІЗТ + ефавіренз: 2 НІЗТ + атазанавір/ ритонавір [j] або лопінавір/ ритонавір	

[a] Необхідно припинити використання ставудина в схемах 1 ряду для лікування дорослих та підлітків
[b] В деяких випадках можна використовувати абакавір/бідислені/ІП (атазанавір/ритонавір, дарунавір/ритонавір, лопінавір/ритонавір)
[c] Дані по безпеці і ефективності долутегравіра і ефавіренза 400 мг при використанні в схемах лікування вагітних, людей з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ і підлітків молодших 12 років поки що недоступні
[d] Умовна рекомендація, середня якість доказів
[e] Знижене дозування ефавіренза (400 мг/день)
[f] У якості альтернативної схеми другого ряду для лікування дорослих і підлітків можна використовувати ралтегравір + лопінавір/ритонавір
[g] Рекомендоване дозування препарату дарунавір/ритонавір для пацієнтів з досвідом лікування ІП повинне бути 600 мг/100 мг два рази на день
[h] Дані по безпеці і ефективності долутегравіра для лікування дітей старших 12 років і вагітних жінок поки що недоступні
[i] Яцаралтегравір недоступний, заміна схеми не рекомендована (див. повну версію Рекомендацій)
[j] Атазанавір/ритонавір може використовуватися для лікування дітей старших 3 місяців (див. повну версію Рекомендацій)
[k] Якщо долутегравір недоступний, для дітей, які потерпіли невдачу лікування схемами другого ряду на основі ІП і в схемах котрих не було ралтегравіру, можна використовувати ралтегравір (див. повну версію Рекомендацій)
[l] Не рекомендоване використання дарунавір/ритонавіру для дітей молодших 3 років

Таблиці складені на основі інформації, отриманої з відкритих джерел, і розроблені виключно для ознайомчих цілей. При розробці використано матеріали <http://www.drgugs.com>, "Генерик - лікарський засіб, який продається під чужою назвою, яка відрізняється від фірмової назви розробника препарату. І містить таку ж саму діючу речовину, що і лікарський засіб-оригінал." І призначений для лікування тих же самих станів захворювання. **Остаточне рішення щодо схеми лікування і режиму прийому приймає лікар. ***Мінімальні ціни на препарати вказані станом на липень 2015 року, дані отримані з сайту <http://msfaccess.org>. Плакат оновлено у вересні 2016 року.